



FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

माटोको एकीकृत उर्वराशक्ति व्यवस्थापन

गोलभेंडा-भाग एक
उत्पादन योजना र
नर्सरी व्यवस्थापन



USAID
अमेरिकी जनताबाट



IFDC
Developing Agriculture from the Ground Up

CIMMYT
अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र

ACKNOWLEDGEMENT

I would like to express my gratitude to the many people who provided support in developing the **training manual for tomato** of the Feed the Future's Nepal Seed and Fertilizer (NSAF) Project which was made possible with the support of the United States Agency for International Development (USAID). I am extremely thankful to the International Fertilizer Development Center team: Dr. Yam Gaihre (Soil Scientist), Ramananda Gupta (Agronomist and Extension Specialist) and Shiva Adhikari (Training and Extension Associate) for their overall leadership and enthusiastic support in content development, planning and execution of NSAF's agricultural extension activities.

My sincere appreciation goes to Sanjay Madnani (Communication Consultant) for his invaluable creative approach in designing and transforming the technical information into comprehensible visuals suitable for farmers and value chain actors.

Special thanks to Dr. Ishwori Prasad Gautam (Chief) and Dr. Surendra Shrestha (Senior Horticulturist) of Horticulture Research Division of Nepal Agricultural Research Council for reviewing and providing insightful feedback to improve the publication.

Finally, I would like to especially thank the NSAF team: Dr. Dyutiman Choudhary (Project Coordinator) for his smooth support in the process, Bandana Pradhan (Communication Specialist) for her efforts in coordination, translations and bringing in all the pieces together and Dr. Dilli Bahadur KC (Project Manager) for his excellent efforts in coordinating with DoA and NARC for review and endorsement of the material for further dissemination.

Dr. David Guerena

Soil Scientist- Systems Agronomist
Nepal Seed and Fertilizer Project

DISCLAIMER: This document is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID.) The contents of this document are the sole responsibility of the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

निम्न कुराहरुको सहि समायोजन


बालीको जात



प्रांगारिक पदार्थ



रासायनिक मलको व्यवस्थापन



जग्गाको सहि सदुपयोग



सिंचाई




र राम्रो उत्पादन लिनको लागि अपनाइने अन्य बाली
व्यवस्थापनका पक्षहरु




सामग्रीहरू


बीउ



रासायनिक मल



ज्यामी




सिंचाई




कृयाकलापहरू

जग्गाको तयारी



नर्सरी



बेर्ना सार्ने




थप मल



फल टिप्ने



पोष्ट हार्भेष्ट



लगानि र फाइदा



उपयुक्त जातको छनौट कसरी गर्ने


३

उद्देश्य

घरको लागि



स्थानिय वा टाढाको बजारको लागि



गोलभेंडाको बोटको प्रकार

होचो, मध्यम र अग्लो



मौसम

हिउँद



वसन्त



गर्मी




क्षेत्र

मध्य पहाड

तल्लो पहाड

वा तराई



जात	बोटको प्रकार	उत्पादन केजी प्रति रोपनी	
सृजना	अग्लो	४०००-५०००	
स्वरक्षा	अग्लो	४०००-४५००	
एन.एस. २५३५	होचो	२०००-२५००	
मि.एल. ४४३	अग्लो	४०००-५०००	


सवै जातहरु मध्य पहाड र तराईको लागि उपयुक्त छन्।

स्थानिय जात


सानो फल



उत्पादन कम



अउलो



स्वादिलो





घरमा खानाको लागि
राम्रो मानिन्छ ।

हाइब्रिड/उन्नत जात



ठूलो फल



उत्पादन धेरै



रासायनिक मलको प्रतिक्रिया
धेरै दिने




एकनाशको फल, लामो समय
सठ्ठम राख्न सकिने

खास उद्देश्य र बाली
व्यवस्थापनको
लागि प्रजनन्
गरिन्छ ।





सफा




शुद्ध



स्वरस्य



क्षेत्र/ महिना	बैशाख	जेठ	असार	श्रावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फागुन	चैत्र
मध्य पहाड (वर्षे बाली)												
मध्य पहाड र तराई (शरद बाली)												
मध्य पहाड र तराई (हिउँदे बाली)												
मध्य पहाड र तराई (वसन्ते बाली)												




बाली लगाउनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै राम्ररी कुहिएको कम्पोष्ट तथा गोठेमल (१५०० केजी प्रति रोपनी) माटोमा मिसाउनु पर्छ ।




कम्पोष्ट तथा गोठेमल खेतबारीमा ओसारेपछि सकेसम्म छिटो माटोमा मिलाउनु पर्छ । माटोलाई मसिनो बनाउन तिन पटक जति खनजोत गर्नुपर्छ ।

पछिका कार्यहरु गर्नका लागि जग्गा राम्रोसंग सभ्याउनुपर्छ ।




ठाउँको छनौट

घाम लाग्ने, उठेको, सजिलै रेखदेख गर्न
सकिने र सिंचाईको स्रोत नजिकको
ठाउँ छनौट



बार

कुररा र अन्य जनावरबाट जोगाउन बार
लगाउनुपर्छ




नर्सरी माटोको बनोट

सफा, मसिनो र प्रशस्त प्रांगारिक पदार्थ भएको



नर्सरी व्याडको आकार



निकास

दुई व्याड बीचको दूरी ३०-४० से.मी. राख्नुपर्छ

प्रांगारिक र रासायनिक मल

१५ के.जी. गइयौला मल

३० ग्राम डिएपी

३० ग्राम पोटास मल

बीउ रोप्नु पहिले माटोको माथिल्लो ५ से.मी. सतम


मल मिलाउनु पर्छ



बीउ रोप्ने दुरी

बीउ १ से.मी. को फरकमा
रोप्नुपर्छ


दुई हार बीचको दूरी ५ से.मी.



नर्सरीको लागि छाप्रो


१२० से.मी. चौडाई

९० से.मी. को
उचाई




नर्सरीको लागि टनेल

५० से.मी. अग्लो




चुरिया टप ड्रेसिङ

बीउ रोपेको १५ दिन पछि ३० ग्राम चुरियाले टप ड्रेसिङ गर्नुपर्छ
एक रोपनी जग्गाको लागि ७-१० ग्राम बीउ आवश्यकता पर्छ




कुरुरा तथा जनवारबाट जोगाउनुपर्छ



बीउ उम्रीएको निरिक्षण गर्नुपर्छ



नियमित सिंचाई गर्नुपर्छ




गोडमेल गर्नुपर्छ



बीउ रोपेको १५ दिन पछि ३० ग्राम चुरियाले टप ड्रेसिङ गर्नुपर्छ



रोग तथा कीराको समस्या भएमा
प्राविधिकसंग सल्लाह लिनुपर्छ





FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

माटोको एकीकृत उर्वराशक्ति व्यवस्थापन

गोलभेंडा - भाग दुई
बाली व्यवस्थापन



USAID
अमेरिकी जनताबाट



IFDC
Developing Agriculture from the Ground Up

CIMMYT
अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र

प्रांणारिक मलसंगै जोताई




भारपात तथा बालीको ठुठारु हटाउने



जोतिसकेपछि सम्याउनुपर्छ



बेर्ना सार्नको लागि
लाइन तथा बेड
बनाई सिंचाई
कुलोसंग जोडनु पर्छ






બેર્નાહરુ રોપ્નકા લાગિ ૨૫-૩૦
દિનમા તયાર હુઠ્ઠન્


બેર્ના ઉચેલ્નુ મઠ્ઠા ૨-૩
દિન અગાડિ દેરિવ સિંચાઈ
ગર્ન બઠ્ઠ ગર્નુપર્થ ર
બેર્નાલાઈ ઘામમા
દેરવાઉનુપર્થ




બેર્ના ઉચેલ્નુ મઠ્ઠા ૨-૪ ઘણ્ટા પહિલે નર્સરીમા
સિંચાઈ ગર્નુપર્થ




बेर्ना दिउंसो घाम कम भएपछि उखेलनुपर्छ



बेर्नाको जरामा पर्याप्त माटो हुनुपर्छ




बेर्नालाई
सकेसम्म
छिटो सार्नुपर्छ




धेरै नजिकको दूरीले
खाद्यतत्व र प्रकाशको लागि
प्रतिस्पर्धा बढाउँछ

धेरै टाढाको दूरीमा
खाद्यतत्व र प्रकाशको उपयोग
प्रभावकारी रूपमा हुंदैन



अउलो जात



होचो जात



बेर्ना सांझपरख वा बादल लागेको
दिनमा सार्नुपर्छ




बेर्ना चार पातको
अवस्थामा सारिन्छ

नर्सरीमा बेर्नाको जति भाग माटो मुनि थियो सार्दा पनि त्यति
भाग मात्र माटो मुनि हुनुपर्छ


बेर्ना सार्नसाथ हल्का सिंचाई गर्नुपर्छ






डिएपि र पोटास मललाई बेर्नाको
वरिपरि ६ से.मी. अर्धव्यास भएको
घेरा बनाई हाल्नु पर्छ

६५ X ६० को दूरी
प्रति बोट १४.५ ग्राम डिएपि
र ६.५ ग्राम पोटास मल




६० X ५० को दूरी
प्रति बोट १० ग्राम डिएपि
र ५ ग्राम पोटास मल



६० X ४० को दूरी
प्रति बोट ७.७ ग्राम डिएपि
र ४.१ ग्राम पोटास मल

प्रति रोपनी १६ के.जी. डिएपि र ८.३ के.जी. पोटास मल
आवश्यक पर्छ।

ઠ્ઠારપાત સંગૈ ઇષ્કો સ્સરાવ બાલી




ઠ્ઠારપાત રહિત રામ્રો બાલી

બાલીકો શુરુકો અવસ્થામા ગોડમેલ ર ડકેરા લગાડને
કામ હાતલે ગર્નુપર્ષ



રોગ ર કીરા સમ્બન્ધિ કુનૈ સમસ્ચા
આષ્મા પ્રાવિધકસંગ સલ્લાહ લિનુપર્ષ



थप मल दिनु पहिले




फुल फुलेको अवस्थामा



फल लागेको अवस्थामा



प्रत्येक टिपाई पछि



पर्याप्त चिस्यान मात्र हुनुपर्छ तर धेरै पानी हुनु हुँदैन । सामान्यतया ७-१० दिनको अन्तरालमा सिंचाई गर्नुपर्छ ।

वर्षाको समयमा निकासको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ

पहिलो टप ड्रेसिङ बेर्ना सारेको २० दिनमा गर्नुपर्छ



गोडमेल

दोस्रो टप ड्रेसिङ फल लागेको अवस्थामा गर्नुपर्छ



गोडमेल

टप ड्रेसिङ




दुई पटक टप ड्रेसिङ
गर्दा ७५ X ६० दूरीको
लागि ६.८ ग्राम, ६०
X ५० दूरीको लागि
४.५ र ६० X ४०
दूरीको लागि ३.६
ग्राम चुरिया प्रत्येका
बोटमा हाल्नुपर्छ

एक रोपनी जग्गाको लागि १५ के.जी. चुरिया लाई दुई भाग लगाई
दुई पटक हाल्नुपर्छ

अउलो जात


जब बोट ३०-४० से.मी. अउलो हुन्छ, एउटा सहायक हांगालाई मात्र राखेर तलको अन्य कोपीलालाई हटाउनुपर्छ र यसरी राखिएको सहायक हांगा र मुख्य हांगालाई माथि तिर V आकारमा लैजानुपर्छ।



आंखलाबाट आउने अन्य सवै मुनहरुलाई निरन्तर हटाउदै गर्नुपर्छ।




बोटलाई पहिलो पटक जमिनबाट ३० से.मी. माथि क्लिप लगाउनुपर्छ र हांगालाई डोरीमा घुमाउदै माथि बढाउनुपर्छ। आवश्यक भएमा हांगाको बीच बीचमा क्लिप लगाउन सकिन्छ।



रोगी तथा पुराना पातहरुलाई हटाउनुपर्छ।

आफैं खसेका पुराना र पहेंलिएका पातहरु

पोलहरुमा तानिएको तारमा थांका लगाइएको डोरी बाँध्नुपर्छ



होचो जात

सवै भन्दा तलका दुई सहायक
कोपिला हटानुपर्छ





FEED THE FUTURE

The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

माटोको एकीकृत उर्वराशक्ति व्यवस्थापन

गोलभेंडा-भाग तिन
फल टिपाई र
पोष्ट हार्नेष्ट



USAID
अमेरिकी जनताबाट




IFDC
Developing Agriculture from the Ground Up

CIMMYT
अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र

घरमा खानाको लागि

फल हल्का रातो तथा पुरै पाकेको


अवस्थामा



स्थानिय बजारको लागि


फल पहेँलो र हल्का रातो भएको

अवस्थामा



ठाढाको बजारको लागि

फल हरियो हुंदै पहेँलो भएको अवस्थामा



अण्डारण र निर्यातको लागि

फल परिपक्व हरियो भएको अवस्थामा



निम्न फलहरू हटाउनुपर्छ

कुहिएको




क्षति पुगेको



आकार विग्रिएको



रोग तथा कीरा लागेको



सरसफाई

माटो, मल, ऋरपात

आदि हटाउनुपर्छ



जात अनुसार

गोलो



अण्डा आकार



लाम्चो




फलको परिपक्वताको अवस्था अनुसार

परिपक्व हरियो




हरियो पहेँलो



पहेँलो रातो



रातो पुरै पाकेको



आकार अनुसार


सानो




मध्यम



ठूलो




प्लाष्टिक केट



बांसको डोको



पाकेको गोलभेंडाको लागि




४-५°C



८५ - ९०% RH

परिपक्व हरियो गोलभेंडाको लागि



१२ - १४°C




९० - ९५% RH


भेट्नो राख्नाले ४-५ दिन
बढि राख्न सकिन्छ



ढुवानी गर्नु पूर्व खेतवारीमा १२-१४ °C मा केहि घण्टा छांयामा राख्नुपर्छ



बजार लैजादा हुने सम्भावित क्षतिलाई
न्युनिकरण गर्छ



खेतवारीबाट बजार पुर्याउन ढिलो गर्नु हुंदैन



रातमा वा बादल लागेको समयमा ढुवानी गर्नुपर्छ

