



बजार - खेल एक


बजार



निलो समुह



हरियो समुह



माटोको एकीकृत उर्वराशक्ति व्यवस्थापन

गहुँ बालीमा
रासायनिक मलको प्रयोग






आवश्यक खाद तत्वहरु



मानिसका लागि आवश्यक खाद तत्वहरु के-के हुन् ?



बोटबिरुवाका लागि
आवश्यक खाद तत्वहरू
के-के हुन् ?







बाली-विरुवाको किन सबै खाद तत्वहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ?

“ यदि माटोमा कुनै एक खाद तत्वको मात्रा कम छ भने, अरु चाहिने खाद तत्वहरु जतिनै थपे पनि उत्पादकत्व बढ्दैन ।”

- *Liebig's law of minimum*





खाद तत्वको वर्गिकरण

4


प्राथमिक खाद तत्वहरु :



नाइट्रोजन



फस्फोरस



पोटासियम


सहायक खाद तत्वहरु :



क्याल्सियम



म्याग्नेसियम



गन्धक

शुक्ष्म खाद तत्वहरु :



जस्ता



बोरोन



मोलिब्डेनम



फलाम



तामा



क्लोरिन



म्याङ्गनिज




निकेल



चलायमान तथा स्थिर खाद तत्वहरू


5





गहुँको स्वस्थ बोट

6






बाली-विरुवामा खाद तत्वको कमीका लक्षणहरु

7

गहुँ बालीमा नाइट्रोजन (N) को कमी



लक्षण बढ्दै जाँदा, पुरानो पातको टुप्पो तिर बाट हल्का पहेँलो हुदै पातको फेदतिर बढ्दै जान्छ ।

हल्का कमीको अवस्थामा बोट/खेत पुर्ण रुपमा एकनासले फिक्का हरियो देखिन्छ ।




बाली-विरुवामा खाद तत्वको कमीका लक्षणहरु

8

गहुँ बालीमा फस्फोरस (P) को कमी



कमि भएको बोट गाढा हरियो, होचो, मसिनो र लुलो देखिन्छ ।



पातको टुप्पो तिर बाट बैजनि रंग देखा पर्छ र विस्तारै सुन्तला पहेँलो हुदै सुन्तला बैजनि रंग मा परिणत हुन्छ ।



बाली-विरुवामा खाद तत्वको कमीका लक्षणहरु

9

गहुँ बालीमा पोटासियम (K) को कमी



पुरानो पातको टुप्पो तिर बाट किनारा मा हल्का पहेंलो हुदै सुकेर फेद तिर बढ्छ र प्रायः जसो पातको बीचको नशा भने हरियो नै देखिन्छ ।



बाली-विरुवामा खाद तत्वको कमीका लक्षणहरु

10

गहुँ बालीमा क्याल्सियम (Ca) को कमी



पहिलो लक्षण भनेको नयाँ पातको बीचमा सुकेको दाग देखिन्छ । यो दाग छिटै फैलिन्छ र पात खुल्नु अघि नै पातको मध्य भाग हुदै नश्ट हुन्छ ।

क्याल्सियमको कमिले गहुँ को बाला ढिलो निस्कने र खुम्चिने हुन्छ ।



बाली-विरुवामा खाद तत्वको कमीका लक्षणहरु

||

गहुँ बालीमा म्याग्नेसियम (Mg) को कमी



नयाँ पात नखोलिने र हरियोपना हराइ
बेरिएको देखिन्छ ।



पुरानो पातमा हरियो पना हराइ छिर्के मिर्के देखिन्छ र
कहिले काहि पातको किनारा रातो भएर जान्छ ।



बाली-विरुवामा खाद तत्वको कमीका लक्षणहरु

12

गहुँ बालीमा गन्धक (S) को कमी



नयाँ पातको नशा र नशाको बीच भाग
एकनासले पुरै पहेँलिन्छ र पुराना पातहरु प्रायः
जसो हरियै रहन्छ ।



लक्षण बढ्दै गएमा, हल्का पहेँलिएका कलिला
पातहरु नसुकिकनै सेता देखिन्छन् ।




गहुँ बालीमा फलाम (Fe) को कमी



हल्का कमिको अवस्थामा सबै भन्दा कलिला पातको नशा बीचको तन्तु अस्थायी रुपमा फिक्का हुँदै जान्छ तर नशाहरु प्रष्ट हरियो नै देखिन्छ ।

कमि भइरहे हरियो नशा पनि फिक्क हरिया हुदै हल्का पहेँलो हुन्छ






गहुँ बालीमा म्याङ्गनिज (Mn) को कमी



कलिला पात हल्का खैरो भइ नशाको बीचमा धर्सा जस्तो दागहरु देखिन्छ ।



क्रमशः पातको तल्लो आधा भाग मा हरियो पना हराइ सुकेर नष्ट हुन्छ ।



गहुँ बालीमा जस्ता (Zn) को कमी



← लक्षण खास गरि पातको बीच भागमा विकसित हुन्छ र पातको मध्य भागमा मैलो खैरो हरियो दाग देखा पर्छ । मैलो खैरो हरियो दाग पछि गएर हल्का खैरो सुकेको धब्बा मा परिणत हुन्छ ।






बाली-विरुवामा खाद तत्वको कमीका लक्षणहरु

16

गहुँ बालीमा बोरोन (B) को कमी




नयाँ पात को वार पार
मसिनो धर्सामा हरियो पना
हराउँछ ।

नयाँ टुसा सुक्छ र डाँठ
ओइलाएर जान्छ ।





गहुँ बालीमा तामा (Cu) को कमी



शुरुको अवस्थामा नयाँ पत्ताहरु फिक्का हरियो भएर पहेँलिन्छन् र पछि नुहिन्छ अथवा ओइलाउँछ ।



कमि बढदै गएमा, नयाँ पातको टुप्पो हल्का खैरो भइ सुकेर मर्छ र कडा नली जस्तै भएर बेरिन्छ - यो गहुँ बालीमा तामाको कमिको विशेष लक्षण हो ।



खाद तत्वको कमीका लक्षणहरु

18



स्वस्थ पात



नाइट्रोजन (N) पुरानो पातको टुप्पो तिर बाट हल्का पहेँलो



फस्फोरस (P) पातको टुप्पो तिर बाट बैजनि रंग



पोटासियम (K) पातको टुप्पो तिर बाट किनारा मा हल्का पहेँलो



जस्ता (Zn) पातको मध्य भागमा खैरो सुकेको धब्बा



गन्धक (S) एकनासले हल्का पहेँलिएका कलिला पातहरु




प्लेस्टोर बाट प्लान्टिक्स डाउनलोड गर्नुहोस् ।

बालीमा भएको समस्याको फोटो लिनुहोस् ।



नतीजा तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहोस् ।




बालीको सही उपचार गर्नुहोस् ।







खल्लीमा अट्ने बाली रोगहरु सम्बन्धित पुस्तिका



मौसम सम्बन्धि जानकारी

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बिज्ञहरु संग आफ्नो समस्याको बारेमा छलफल गर्नुहोस् ।





रासायनिक मलमा पाइने तत्वहरु कसरी पढ्ने ?

21

१ N K P

२ P K N

४ P N K

३ N P K

५ K P N



रासायनिक मलका प्रकारहरु

22

स्ट्रेट मल

एउटा मात्र खाद तत्व प्रदान गर्दछ ।



कम्पाउण्ड मल

दुई वा दुईभन्दा बढी खाद तत्वहरु प्रदान गर्छ ।





4R मलको सही प्रयोग गर्ने तरीका


23

१. सही स्रोत: कस्तो प्रकारको मल प्रयोग गर्ने? UREA? DAP? MOP?


२. सही मात्रा: कति मल प्रयोग गर्ने?



३. सही समय: कुन अवस्थामा/समयमा मल प्रयोग गर्ने?



४. सही ठाउँ: कहाँ-कसरी मल प्रयोग गर्ने ?






4R मलको सही प्रयोग गर्ने तरीका

24

१. सही स्रोत: बाली अनुसार







4R मलको सही प्रयोग गर्ने तरीका

25

१. सही स्रोत: माटोको प्रकार तथा यसको उर्वराशक्ति





4R मलको सही प्रयोग गर्ने तरीका

26

१. सही स्रोत: मौसम तथा जलवायुको अवस्था



एमोनियम सल्फेट


युरिया





बाली लगाउने समयमा प्रयोग गर्ने मलहरू

27



डि.ए.पी (DAP) 18 : 46 : 0

एम.ओ.पी (MOP) 0 : 0 : 60





विजय

बाणगंगा

एन.एल ९७१

गौतम




4R मलको सही प्रयोग गर्ने तरीका

29

२. सही मात्रा

प्रति मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन गर्दा ...



माटोबाट खाद तत्वहरू
बाहिर जान्छन्



— २७ के जी **N**

— १० के जी **P**

— ४७ के जी **K**

माटोबाट बाहिरीएको खाद
तत्वहरू मात्रा मलबाट
पूर्ति गर्नु पर्दछ



+ २७ के जी **N**

+ १० के जी **P**



+ ४७ के जी **K**





4R मलको सही प्रयोग गर्ने तरीका

30

२. सही मात्रा



उत्पादनको लक्ष्य अनुसार मलको मात्रा
थप्दै जानुपर्दछ





4R मलको सही प्रयोग गर्ने तरीका

31

२. सही मात्रा




वातावरणीय कारणले खेर जाने खाद तत्वको
पूर्ति पनि थप मलद्वारा गर्नु पर्दछ





२. सही मात्रा

केही खाद तत्वहरु माटोबाट पनि
उपलब्ध हुन्छन् ।





२. सही मात्रा

केही खाद तत्वहरु प्रांगारिक पदार्थहरुबाट पनि उपलब्ध हुन्छन्

बालीका रहलपहलहरु



कम्पोष्ट मल



गोठे मल





मंसिर Nov/Dec						
Sunday आइतवार	Monday सोमवार	Tuesday मंगलवार	Wednesday बुधवार	Thursday बिहीवार	Friday शुक्रवार	Saturday शनिवार
		१ 17 छठ पर्व	२ 18 सप्तमि	३ 19 अष्टमि	४ 20 नवमी	५ 21 दशमी
६ 22 हरिबोधिनी एकादशी व्रत, तुलसी विवाह	७ 23 द्वादशी	८ 24 त्रयोदशी	९ 25 गुरु नानक जयन्ती (सिख कर्मचारी विदा)	१० 26 प्रतिपदा	११ 27 द्वितीया	१२ 28 तृतीया
१३ 29 चतुर्थी	१४ 30 पञ्चमी	१५ 01 षष्ठी	१६ 02 सप्तमि	१७ 03 अष्टमि	१८ 04 नवमी	१९ 05 दशमी
२० 06 गुह्येश्वरी जात्रा	२१ 07 एकादशी	२२ 08 द्वादशी	२३ 09 त्रयोदशी	२४ 10 चतुर्थी	२५ 11 औशी	२६ 12 प्रतिपदा
२७ 13 द्वितीया	२८ 14 तृतीया	२९ 15 चतुर्थी				

मंसिर को पहिलो


तिन हप्ता




कम्पोष्ट र गोठे मलको प्रयोग

35

कम्पोष्ट तथ गोठे मल खेत:बारीमा ओसारे पछि
सके सम्म छिटो माटोमा मिलाउनु पर्छ ।



बाली लगाउनु भन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै राम्ररी
कुहिएको कम्पोष्ट तथा गोठे मल माटोमा मिसाउनु पर्छ









बाली लगाउने सहि दुरी


36

अति प्रतिस्पर्धा हुन्छ




जमिन खेर जान्छ






बीउ र मल लाई १२.५ से.मि. अन्तरको लाइनमा पालै पालो एक पछि अर्को लाइनमा राख्नु पर्छ ।



बढि उत्पादनका लागि
एकनाशको पर्याप्त
बोटको संख्या



रोग तथा किरा व्यवस्थापन
गर्न सजिलो

बाली लिन सजिलो



बाली व्यवस्थापनमा
सहजिकरण -गोडमेल,
सिंचाइ, मलको प्रयोग

बाली को वृद्धि विकास का लागि बाली लगाइसके पछि थप मल दिनु पर्छ ।


खास गरि नाइट्रोजन युक्त मल दिइन्छ ।
पहिलो थप मल रोपेको २१ दिन मा र दोश्रो थप मल रोपेको ४५ दिनमा दिइन्छ ।

थप मल दिनु अघि बाली लाइ सिचाइ गर्नु पर्छ ।



२१ दिन

४५ दिन





थप मल को प्रयोग

40

स्प्रेडर द्वारा थप मलको प्रयोग





मल सहि प्रयोग गर्दा हुने फाइदा

41

मलको सहि प्रयोगमा भएको उत्पादकत्व	4600 kg	
किसानले आफ्नै तरिकाले मल प्रयोग गर्दा भएको उत्पादकत्व	4200 kg	- 400 kg
सामान्यतया किसानको प्रणालि बाट भएको उत्पादकत्व	3800 kg	- 400 kg

सहि मलको प्रयोगले मल खेर जान बाट जोगाउँछ र लागत घटाउँछ ।